



### Викторина «Жизнь без туберкулёза!»

Как Вы думаете, туберкулёт – это инфекционное заболевание?

- да
- нет

Чем вызывается туберкулёт? Назовите возбудителя.

- пневмококк
- вирус Эбола
- бацилла Коха
- дрожжи

Основным источником туберкулезной инфекции для человека являются:

- предметы окружающей среды
- продукты питания
- больной человек
- всё перечисленное

Заражение человека туберкулёзом чаще происходит:

- через пожатие рук
- половым путём
- воздушно- капельным путём
- через инфицированные медицинские инструменты (шприцы, иглы и т.д.)

Какие факторы способствуют заболеванию туберкулёзом?

- возраст старше 60 лет
- табакокурение, злоупотребление алкоголем, неполноценное питание
- недостаток витаминов, аллергия к пищевым продуктам
- частые острые респираторные заболевания, ангины

Какие органы, кроме легких может поражать туберкулез?

- кожа
- лимфатические узлы
- почки
- глаза
- все перечисленное

Какие из перечисленных признаков относятся к туберкулёзу легких?

- головная боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами
- боли в животе, тошнота, рвота
- кашель 2-3 недели, боли в груди, потеря веса, потливость, периодическое повышение температуры
- боли в области сердца, одышка, отёки ног
- высокая температура, кашель с мокротой, головная боль, першение в горле

Какие из перечисленных методов могут выявить туберкулёз?

- исследование анализа крови
- исследование анализа мочи
- электрокардиограмма
- флюорография (рентгенография)

При помощи какого метода можно выявить туберкулёз в ранних сроках?

- прививки от туберкулёза
- реакция Манту
- реакция Пирке
- анализ крови

Профилактическое флюорографическое обследование необходимо проходить:

- 1 раз в 5 лет
- 1 раз в 3 года
- не реже 1 раза в 2 года

Излечим ли туберкулёз?

- да
- нет
- зависит от срока заболевания

Назовите меры профилактики туберкулеза?

- **прививки вакциной БЦЖ**
- прививки вакциной АКДС
- введение иммуноглобулина
- укрепление иммунитета, полноценное питание
- стерилизация инструментов
- кипячение воды

В каком возрасте делается первая прививка против туберкулёза?

- ребенку в возрасте 1 месяц
- новорожденным на 3-7 день жизни
- ребенку в возрасте 3 месяца

Где вероятность заражения туберкулёзом выше?

- в транспорте, магазине
- на природе